

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Varietas Peking, Thailand, India, dan Samosir memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah helaian daun dan jumlah anakan bawang merah serta tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot kering dan bobot basah umbi. Jumlah anakan terbanyak dihasilkan oleh bawang merah varietas Thailand (7,33 anakan). Jumlah helaian daun terbanyak dihasilkan oleh varietas India (37,88). Tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh varietas peking (25,67 cm), dan umur panen paling cepat dihasilkan oleh varietas India, Thailand, dan Samosir (54 hari). Dan hasil produksi umbi per ton paling tinggi dihasilkan oleh varietas India. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bawang merah yang paling baik adalah varietas Thailand.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti menyarankan bawang merah varietas Thailand yang paling baik dan cocok dikembangkan di daerah Kabupaten Samosir karena memiliki umur panen yang cukup cepat, jumlah anakan yang banyak dan jumlah helaian daun yang cukup banyak . Selain itu peneliti juga menyarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan bawang merah di Kabupaten Samosir sehingga bisa dikembangkan menjadi tanaman indukan.