

ABSTRAK

Jesiska Panggabean. Hubungan Pola Asuh Makan Dan Kesehatan Dengan Kejadian Diare Pada Baduta Usia 6-24 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Tegal Sari Kota Medan. Skripsi. Program Studi Gizi. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Medan. 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Karakteristik responden; (2) Pola asuh makan pada baduta; (3) Pola asuh kesehatan pada baduta; (4) Kejadian diare pada baduta; (5) Hubungan pola asuh makan dengan kejadian diare pada baduta; (6) Hubungan pola asuh kesehatan dengan kejadian diare pada baduta; (7) Hubungan pola asuh makan dan kesehatan dengan kejadian diare pada baduta. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 68 orang. Desain penelitian yang digunakan *cross sectional*. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuisioner. Data pola asuh makan, pola asuh kesehatan dan kejadian diare menggunakan kuisioner. Teknik analisis data menggunakan deskripsi data uji korelasi *rank spearman*, dan uji *regresi logistik*.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pola asuh makan pada baduta termasuk kategorik buruk sebesar 69,1 persen. Pola asuh kesehatan pada baduta termasuk kategorik buruk sebesar 60,3 persen. Kejadian diare pada baduta yang diperoleh sebesar 64,7 persen. Berdasarkan hasil analisis uji korelasi *rank spearman* menunjukkan terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pola asuh makan dengan kejadian diare pada baduta dengan koefisien korelasi sebesar -0,494 dan p value 0,00 pada taraf signifikan 0,005 artinya jika pola asuh makan baik maka angka kejadian diarenya akan semakin rendah. Berdasarkan hasil analisis uji korelasi *rank spearman* menunjukkan terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pola asuh kesehatan dengan kejadian diare pada baduta dengan koefisien korelasi sebesar -0,449 dan p value 0,00 pada taraf signifikan 0,005 artinya jika pola asuh kesehatan baik maka angka kejadian diarenya akan semakin rendah. Berdasarkan hasil uji *regresi logistik* menunjukkan pola asuh makan kategori sedang memiliki pengaruh signifikan dengan kejadian diare ($p = 0,09$, $p < 0,05$) nilai OR = 0,110 dan pola asuh kategori baik memiliki pengaruh signifikan dengan kejadian diare ($p = 0,018$, $p < 0,05$) nilai OR = 0,115. Pada pola asuh kesehatan kategori sedang memiliki pengaruh signifikan dengan kejadian diare ($p = 0,004$, $p < 0,05$) nilai OR = 0,125. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh makan berhubungan signifikan dengan kejadian diare dan pola asuh kesehatan kategori sedang berhubungan signifikan dengan kejadian diare. Nilai *R square* yang diperoleh sebesar 44 persen.

ABSTRACT

Jesiska Panggabean. *The Relationship between Parenting Eating and Health and the Incidence of Diarrhea in Clowns Aged 6-24 Months in the Working Area of the Tegal Sari Health Center, Medan City. Thesis. Nutrition Study Program. Faculty of Engineering. Medan State University. 2024.*

This study is to find out: (1) Characteristics of respondents; (2) Parenting style of eating in baduta; (3) Health parenting in baduta; 4) The incidence of diarrhea in baduta; (5) The relationship between parenting and feeding and the incidence of diarrhea in baduta; (6) The relationship between health care and the incidence of diarrhea in baduta; (7) The relationship between parenting and health and the incidence of diarrhea in baduta. The sampling technique was carried out by purposive sampling until a sample of 68 people was obtained. The research design used was cross sectional. The data collection technique was carried out using a questionnaire. Data on parenting style, parenting style, health and the incidence of diarrhea using questionnaires. The data analysis technique uses data description, spearman rank correlation test, and logistic regression test.

The results of the study obtained that the feeding parenting of clowns included the bad category of 69.1 percent. The health parenting style of clowns is included in the bad category of 60.3 percent. The incidence of diarrhea in clowns obtained was 64.7%. The results of the spearman rank test showed that there was a negative and significant. The value of the correlation coefficient of spearman rank of parenting style obtained was $-.494$. The results of the spearman rank test showed that there was a negative and significant. The value of the spearman rank correlation coefficient obtained for health parenting was $-.449$. The results of the logistic regression test showed that the medium category of feeding parenting had a significant influence on the incidence of diarrhea ($p = 0.09$, $p < 0.05$) OR = 0.110 and good category parenting had a significant influence on the incidence of diarrhea ($p = 0.018$ ($p < 0.05$) OR = 0.115. In the medium category of health care, it has a significant influence on the incidence of diarrhea ($p=0.004$, $p < 0.05$) OR = 0.125. The results showed that eating parenting was significantly related to the incidence of diarrhea and the moderate category health parenting was significantly related to the incidence of diarrhea was the moderate category of health parenting. The R square value obtained was 44 percent.